

Կոնսուլտատիվ եզրակացություն

Հիվանդը՝ Նաիրա Սուդյանը, 1984 թ.ծ., գտնվում է Էրեբունի ԲԿ-ի նյարդաբանական բաժանմունքում ամբուլատոր հետազոտման և բուժման:

Գանգատները. Վերջույթների արտահայտված թուլություն, որը բերել է քայլելու, նստած դիրքից բարձրանալու, ֆիզիկական որևէ աշխատանք կատարելու զգալի դժվարության:

Հիվանդության անամնեզը. Իրեն հիվանդ է համարում դպրոցական տարիներից, երբ արտահայտվեց և աստիճանաբար զարգացավ վերը նշված թուլությունը: Որևէ բուժում այդ կապակցությամբ չի ստացել:

Օբյեկտիվ նյարդաբանական ստատուսում առկա է վերին և ստորին վերջույթների մկանային ուժի պակասում 3/5 բալ և դիստալ, և պրոքսիմալ հատվածներում: Ջլային ռեֆլեքսները հավասարաչափ տորալիդ են, պաթոլոգիկ ռեֆլեքսներ չկան: Զգացողական խանգարումները հայտնաբերվում են հիպեսթեզիայի տեսքով պոլինեյրոպաթիկ ձևով:

Կատարվել է ԷՆՄԳ հետազոտություն, որը հայտնաբերել է արտահայտված դեմիելինիզացնող սենսոմոտոր պոլինեյրոպաթիա կոպիտ երկրորդային աքսոնալ ախտահարումով (մինչև 80%) վերին և ստորին վերջույթներում:

Ախտորոշումը. Շարկո-Մարիի հիվանդություն վերին և ստորին վերջույթների արտահայտված դեմիելինիզացնող սենսոմոտոր պոլինեյրոպաթիայով կոպիտ երկրորդային աքսոնալ ախտահարումով մինչև 80% հենաշարժիչ ֆունկցիայի խանգարումով:

Անցկացված բուժումը. Միլդրոնատ 5մլ մ/մ 10 օր, այնուհետև միլդրոնատ 500 մգ/օրը 1 ամիս, L-կառնիտին 500 մգ/օրը երկարատև, բուժական ֆիզկուլտուրա:

Հիվանդը կարիք ունի երկարատև հսկողության և բուժման: